

## 1.1 연습문제

1.

$$|a-1|+|a-2|+|a-3|+|a-4|+|a-5|$$

**풀이**  $a=1$ 일 때,  $|a-1|+|a-2|+|a-3|+|a-4|+|a-5|=0+1+2+3+4=10$

$a=2$ 일 때,  $|a-1|+|a-2|+|a-3|+|a-4|+|a-5|=1+0+1+2+3=7$

$a=3$ 일 때,  $|a-1|+|a-2|+|a-3|+|a-4|+|a-5|=2+1+0+1+2=6$

$a=4$ 일 때,  $|a-1|+|a-2|+|a-3|+|a-4|+|a-5|=3+2+1+0+1=7$

$a=5$ 일 때,  $|a-1|+|a-2|+|a-3|+|a-4|+|a-5|=4+3+2+1+0=10$

이므로  $M=10$ ,  $m=6$ 이므로  $M+m=16$ 이다.

3.

**풀이**  $0 < a < b < c$ 을 만족하는 수를  $a=1, b=2, c=3$ 이라 하면,

$$A = \frac{a}{c} = \frac{1}{3}, \quad B = \frac{a+b}{b+c} = \frac{3}{5}, \quad C = \frac{a-c}{c-a} = -\frac{2}{3}$$

이므로  $C < A < B$ 이다.

5.

**풀이**  $1 < a = \sqrt{2} < 2$ 이므로  $a-1 > 0, 1-a < 0$ 이다. 그러므로

$$|a-1|+|1-a|=(a-1)-(1-a)=2a-2=2+2\sqrt{2}$$

이다.

7.

**풀이**  $1 < a < 2$ 이므로  $a-3 < 0, a-1 > 0, a-2 < 0, a+3 > 0$ 이므로

$$|a-3|-|a-1|-|a-2|+|a+3|=- (a-3) - (a-1) + (a-2) + (a+3) = 5$$

이다.

9.

**풀이**  $1 < a < 2$ 이므로  $a-1 > 0$ 이고, 따라서  $\sqrt{(a-1)^2} = a-1$ 이다. 그러므로

$$\sqrt{(a-1)^2} - 1 = (a-1) - 1 = a-2$$

이고,  $a-2 < 0$ 이므로  $\sqrt{(\sqrt{(a-1)^2} - 1)^2} = \sqrt{(a-2)^2} = -(a-2)$ 이다. 따라서

$$\sqrt{(\sqrt{(a-1)^2} - 1)^2} - |a-2| = -(a-2) - \{-(a-2)\} = 0$$

이다.

11. 등식  $(a-b) + (a+b)\sqrt{3} = 5 + 2\sqrt{3}$  을 만족하는 유리수  $a$ 와  $b$ 를 구하여라.

**풀이**  $(a-b) + (a+b)\sqrt{3} = 5 + 2\sqrt{3}$  이므로 연립방정식  $a-b=5$ ,  $a+b=2$ 를 얻는다. 따라서  $a = \frac{7}{2}$ ,  $b = -\frac{3}{2}$  이다.

## 1.2 연습문제

1.

**풀이** (a)  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{-5}}{\sqrt{-3} \sqrt{-4}} = \frac{\sqrt{2} \sqrt{5} i}{\sqrt{3} i \sqrt{4} i} = -\frac{\sqrt{10} i}{2\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{30}}{6} i$

(b)  $\frac{\sqrt{-36}}{\sqrt{-9}} + \sqrt{-256} = \frac{\sqrt{36} i}{\sqrt{9} i} + \sqrt{256} i = \frac{6}{3} + 16i = 2 + 16i$

3.

**풀이** (a)  $\frac{1}{z} = \frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{bi}{a^2+b^2}$  이므로  $\operatorname{Re}(1/z) = \frac{a}{a^2+b^2}$  이다.

(b)  $z^2 + i = (a+bi)^2 + i = a^2 - b^2 + 2abi + i = a^2 - b^2 + (2ab+1)i$  이므로  
 $\operatorname{Im}(z^2 + i) = 2ab + 1$  이다.

(c)  $z^2 + \bar{z}^2 = (a+bi)^2 + \overline{(a+bi)^2} = (a^2 - b^2) + 2abi + \overline{(a^2 - b^2) + 2abi} = 2(a^2 - b^2)$  이므로  
 $\operatorname{Im}(z^2 + \bar{z}^2) = 0$  이다.

(d)  $z - 2 + 3i = (a+bi) - 2 + 3i = (a-2) + (b+3)i$  이므로  
 $|z - 2 + 3i| = \sqrt{(a-2)^2 + (b+3)^2}$  이다.

5.

**풀이** (a)  $a - 2 = 3, b + 1 = -1$  이므로  $a = 5, b = -2$  이다.

(b)  $a + 1 = 0, a + b - 1 = 0$  이므로  $a = -1, b = 2$  이다.

(c)  $\frac{a}{1-i} + \frac{b}{1+i} = \frac{a(1+i) + b(1-i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{a+b + (a-b)i}{2} = 2 - i$  이므로  
 $a+b + (a-b)i = 4 - 2i$  이고, 따라서  $a = 1, b = 3$  이다.

(d)  $\frac{a}{1+i} + \frac{b}{1-i} = \frac{a(1-i) + b(1+i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{a+b + (-a+b)i}{2} = 3$  이므로  
 $a+b + (-a+b)i = 6$  이고, 따라서  $a = b = 3$  이다.

7.

**풀이**  $z = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)(1+i)}{2} = \frac{2i}{2} = i$  이므로  $z^2 = -1, z^3 = -i, z^4 = 1$  이고

따라서  $z + z^2 + z^3 + z^4 = 0$  이다. 그러므로

$$\begin{aligned} 1 + (z + z^2 + z^3 + z^4) + \dots + z^{2008} (z + z^2 + z^3 + z^4) + z^{2013} + z^{2014} + z^{2015} \\ = 1 + z^{2013} + z^{2014} + z^{2015} = 1 + z^{2012} (z + z^2 + z^3) \\ = 1 + (z^4)^{504} (i + i^2 + i^3) = 1 + (i - 1 - i) = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

이다.

9.

 (a) 준식  $= i - i^2 + i^3 - i^4 + i^5 - i^6 + i^7 - i^8$   
 $= i - (-1) - i - 1 + i - (-1) - i - 1 = 0$

(b) 준식  $= i - 2i^2 + 3i^3 - 4i^4 + 5i^5 - 6i^6 + 7i^7 - 8i^8$   
 $= (i + 2 - 3i - 4) + (5i + 6 - 7i - 8) = -4 - 4i$

11.

  $P_1 = (1+i)i = -1+i$ ,  $P_2 = (1+i)i^2 = (1+i) \cdot (-1) = -1-i$ ,  
 $P_3 = (1+i)i^3 = (1+i)(-i) = 1-i$ ,  $P_4 = (1+i)i^4 = (1+i) \cdot 1 = 1+i$   
이므로 각 꼭짓점은  $(-1, 1)$ ,  $(-1, -1)$ ,  $(1, -1)$ ,  $(1, 1)$ 이고,  
이 사각형은 한 변의 길이가 2인 정사각형이므로 구하고자 하는 넓이는 4이다.

## 1.3 연습문제

1.

 (a)  $A(x) + B(x) = (x^2 - 5x + 6) + (x^2 + x - 2) = (x^2 + x^2) + (-5x + x) + (6 - 2)$   
 $= 2x^2 - 4x + 4$

$$A(x) - B(x) = (x^2 - 5x + 6) - (x^2 + x - 2) = (x^2 - x^2) + (-5x - x) + (6 + 2)$$
$$= -6x + 8$$

(b)  $A(x) + B(x) = (x^3 - 3x^2 - 6x + 8) + (x^3 + 3x - 4) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 4$

$$A(x) - B(x) = (x^3 - 3x^2 - 6x + 8) - (x^3 + 3x - 4) = -3x^2 - 9x + 12$$

(c)  $A(x, y) = (x + y - 2)^2 = x^2 + y^2 + 2xy - 4x - 4y + 4$

$$B(x, y) = (x - 2y + 3)^2 = x^2 + 4y^2 - 4xy + 6x - 12y + 9$$

이므로

$$A(x, y) + B(x, y) = (x^2 + y^2 + 2xy - 4x - 4y + 4) + (x^2 + 4y^2 - 4xy + 6x - 12y + 9)$$
$$= 2x^2 + 5y^2 - 2xy + 2x - 16y + 13$$

$$A(x, y) - B(x, y) = (x^2 + y^2 + 2xy - 4x - 4y + 4) - (x^2 + 4y^2 - 4xy + 6x - 12y + 9)$$
$$= -3y^2 + 6xy - 10x + 8y - 5$$

(d)  $A(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy + 2x + 2y - 3$

$$B(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy - 2x + 2y + 1$$

이므로

$$A(x, y) + B(x, y) = (x^2 + y^2 + 2xy + 2x + 2y - 3) + (x^2 + y^2 - 2xy - 2x + 2y + 1)$$
$$= 2x^2 + 2y^2 + 4y - 2$$

$$A(x, y) - B(x, y) = (x^2 + y^2 + 2xy + 2x + 2y - 3) - (x^2 + y^2 - 2xy - 2x + 2y + 1)$$
$$= 4xy + 4x - 4$$

3.

 (a)  $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 2^2 - 2 \cdot 1 = 2$

$$(b) a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b) = 3^3 - 3 \cdot (-2) \cdot 3 = 45$$

$$(c) a^3 - \frac{1}{a^3} = \left(a - \frac{1}{a}\right)^3 + 3a \cdot \frac{1}{a} \left(a - \frac{1}{a}\right) = 3^3 + 3 \cdot 3 = 36$$

$$(d) (a+b)^2 = 16 \text{ 이고 } (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 6 + 2ab \text{ 이므로 } 6 + 2ab = 16, \\ \text{즉 } ab = 5 \text{ 이다. 그러므로 } a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b) = 4^3 - 3 \cdot 5 \cdot 4 = 4 \text{ 이다.}$$

5.

$$\text{풀이 (a) } a^4 - 5a^2 + 4 = (a^2)^2 - 5(a^2) + 4 = \{(a^2) - 1\}\{(a^2) - 4\}$$

$$= (a^2 - 1)(a^2 - 2^2) = (a-1)(a+1)(a-2)(a+2)$$

$$(b) a^2 + ab - (2b^2 + 3b + 1) = a^2 + ab - (2b+1)(b+1) = (a+2b+1)(a-b-1)$$

$$(c) t = a+b \text{ 라 하면, 준식 } = t^2 + 2t - 3 = (t-1)(t+3) = (a+b-1)(a+b+3)$$

$$(d) (a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3$$

$$= (a-b)^3 + b^3 - 3b^2c + 3bc^2 - c^3 + c^3 - 3c^2a + 3ca^2 - a^3$$

$$= (a-b)^3 - (a^3 - b^3) + 3c(a^2 - b^2) - 3c^2(a-b)$$

$$= (a-b)^3 - (a-b)(a^2 + ab + b^2) + 3c(a-b)(a+b) - 3c^2(a-b)$$

$$= (a-b)\{a^2 - 2ab + b^2 - a^2 - ab - b^2 + 3c(a+b) - 3c^2\}$$

$$= (a-b)\{-3ab + 3(a+b)c - 3c^2\} = -3(a-b)\{c^2 - (a+b)c + ab\}$$

$$= -3(a-b)(c-a)(c-b) = 3(a-b)(b-c)(c-a)$$

7.

$$\text{풀이 (a) } A(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6 \text{ 이라 하면, } A(-1) = 0, A(2) = 0, A(3) = 0 \text{ 이므로}$$

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x+1)(x-2)(x-3)$$

$$(b) A(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 3 \text{ 이라 하면, } A(-1) = 0, A(3) = 0 \text{ 이므로}$$

$$2x^3 - 5x^2 - 4x + 3 = (x+1)(x-3)(px+q)$$

이다. 2차 항과 상수항의 계수를 비교하면,  $p=2, q=-1$  이므로

$$2x^3 - 5x^2 - 4x + 3 = (x+1)(x-3)(2x-1)$$

$$(c) A(x) = x^4 - 2x^2 + 3x - 2 \text{ 라 하면, } A(-2) = 0, A(1) = 0 \text{ 이므로}$$

$$A(x) = x^4 - 2x^2 + 3x - 2 = (x+2)(x-1)(px^2 + qx + r)$$

이다. 4차 항과 상수항을 비교하면,  $p=1, -2 = -2r$  즉,  $r=1$  이다.

$$x^4 - 2x^2 + 3x - 2 = (x+2)(x-1)(x^2 + qx + 1)$$

이므로 1차 항을 비교하면,  $3x = -x + 2x - 2qx$  이므로  $q=-1$  이고, 따라서 주어진 식은 다음과 같이 인수분해 된다.

$$x^4 - 2x^2 + 3x - 2 = (x+2)(x-1)(x^2 - x + 1)$$

(d) 주어진 식을 전개하여

$$A(x) = (x+1)^3 - (2x-1)^3 + (x-2)^3 = -3(2x^3 - 3x^2 - 3x + 2) \text{ 라 하면,}$$

$A(-1) = 0, A(2) = 0$ 이므로

$$2x^3 - 3x^2 - 3x + 2 = (x+1)(x-2)(px+q)$$

3차 항과 상수항을 비교하면,  $p = 2, 2 = -2q$  즉,  $q = -1$ 이다. 따라서 주어진 식은 다음과 같이 인수분해 된다.

$$-3(2x^3 - 3x^2 - 3x + 2) = -3(x+1)(x-2)(2x-1)$$

9.

**풀이**  $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) + 1 = (x+1)(x+4)(x+2)(x+3) + 1$

$$= (x^2 + 5x + 4)(x^2 + 5x + 6) + 1$$
$$= (x^2 + 5x)^2 + 10(x^2 + 5x) + 25$$
$$= \{(x^2 + 5x) + 5\}^2 = (x^2 + 5x + 5)^2$$

이므로  $a = b = 5$ 이다.

11.

**풀이**  $(a+b+c)(a-b+c) = (a+b-c)(-a+b+c),$

$$(a+c+b)(a+c-b) = [b+(a-c)][b-(a-c)],$$
$$(a+c)^2 - b^2 = b^2 - (a-c)^2, a^2 + 2ac + c^2 - b^2 = b^2 - a^2 + 2ac - c^2, 2a^2 + 2c^2 = 2b^2,$$
$$a^2 + c^2 = b^2 \text{이므로 } b \text{가 빗변인 직각삼각형이다.}$$

## 1.4 연습문제

1.

- 풀이** (a) 양변을 전개하면,  $x^2 + 2x + 1 = x^2 + (a-4)x + 4 + 2a + b$ 이므로  $a-4=2$ ,  $4+2a+b=1$ 이다. 그러므로  $a=6$ ,  $b=-15$ 이다.
- (b)  $a^2 - 3 = 2a$ ,  $b - 1 = 1$ 이므로  $b = 2$ 이고  $a^2 - 2a - 3 = (a-3)(a+1) = 0$ 이므로  $a = 3$  또는  $a = -1$ 이다.  
그러므로 구하고자 하는  $a, b$ 의 쌍은  $(a, b) = (3, 2), (-1, 2)$ 이다.
- (c)  $2x^2 - 3x - 2 = ax^2 - (a-b)x - bc$ 이므로  $a = 2$ ,  $a - b = 3$ ,  $bc = 2$ 이다.  
그러므로  $a = 2$ ,  $b = -1$ ,  $c = -2$ 이다.
- (d)  $a + 2b = 4$ ,  $b - a = -1$ 이므로  $a = 2$ ,  $b = 1$ 이다.

3.

- 풀이** 주어진 근을  $\alpha = 1 - 3i$ , 또 다른 근을  $\beta = 1 + 3i$ 라 하면,  
 $\alpha + \beta = (1 - 3i) + (1 + 3i) = 2$ ,  $\alpha\beta = (1 - 3i)(1 + 3i) = 10$   
이므로  $\alpha + \beta = -(-a) = a = 2$ ,  $\alpha\beta = b = 10$ 이다.

5.

- 풀이**  $\alpha + \beta = 4$ ,  $\alpha\beta = -6$ 이므로
- (a)  $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 4^2 - 2 \cdot (-6) = 28$
- (b)  $(\alpha - \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta = 28 - 2 \cdot (-6) = 40$ 이므로  $\alpha - \beta = \pm 2\sqrt{10}$
- (c)  $\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 4^3 - 3 \cdot (-6) \cdot 4 = 136$ 이므로  
$$\frac{\beta^2}{\alpha} + \frac{\alpha^2}{\beta} = \frac{\alpha^3 + \beta^3}{\alpha\beta} = \frac{136}{-6} = -\frac{68}{3}$$
- (d)  $\alpha^5 + \beta^5 = (\alpha^2 + \beta^2)(\alpha^3 + \beta^3) - \alpha^2\beta^3 - \alpha^3\beta^2$   
$$= (\alpha^2 + \beta^2)(\alpha^3 + \beta^3) - (\alpha\beta)^2(\alpha + \beta)$$
  
$$= 28 \cdot 136 - (-6)^2 \cdot 4 = 3664$$

7.

- 풀이** (a)  $\omega^{14} + \omega^{13} + 1 = (\omega^3)^4 \cdot \omega^2 + (\omega^3)^4 \cdot \omega + 1 = \omega^2 + \omega + 1 = 0$
- (b)  $1 + \omega^{99} + 2\omega^{47} + 2\omega^{10} = 1 + (\omega^3)^{33} + 2(\omega^3)^{15} \cdot \omega^2 + 2(\omega^3)^3 \cdot \omega = 1 + 1 + 2\omega^2 + 2\omega$   
$$= 2(1 + \omega + \omega^2) = 0$$
- (c)  $\omega^{2013} + \frac{1}{\omega^{2013}} = (\omega^3)^{671} + \frac{1}{(\omega^3)^{671}} = 1 + 1 = 2$

$$\begin{aligned}
\text{(d)} \quad & \left(\omega + \frac{1}{\omega}\right) + \left(\omega^2 + \frac{1}{\omega^2}\right) + \left(\omega^3 + \frac{1}{\omega^3}\right) + \left(\omega^4 + \frac{1}{\omega^4}\right) = \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \frac{1 + \omega + \omega^2 + \omega^3}{\omega^4} \\
& = (\omega + \omega^2) + \omega^3(1 + \omega) + \frac{(1 + \omega + \omega^2) + \omega^3}{\omega^3 \cdot \omega} \\
& = -1 + (1 + \omega) + \frac{1}{\omega} = \omega + \frac{1}{\omega} = -1
\end{aligned}$$

9.

**풀이**  $m$ 의 값에 관계없이 이차방정식이 중근을 가지므로 판별식

$$D/4 = (m + a - 1)^2 - (m^2 + a^2 - 2b) = 2(a - 1)m + (1 - 2a + 2b) = 0$$

이어야 한다. 그러므로  $a - 1 = 0$ ,  $1 - 2a + 2b = 0$ 으로부터  $a = 1$ ,  $b = \frac{1}{2}$ 이다.

## 제1장 연습문제

### 1.1

**풀이** 가장 왼쪽에 있는 수부터 순서적으로 값을 구한다. 우선  $a < e$ 이므로  $\min(a, e) = a$ 이고,  $a < d$ 이므로  $\min(d, \min(a, e)) = \min(d, a) = a$ 이다. 또한  $b < c$ 이므로  $\min(b, c) = b$ 이고,  $\max(\min(b, c), a) = \max(b, a) = b$ 이다. 그러므로

$$\max(a, \max(\min(b, c), \min(d, \min(a, e)))) = \max(a, b) = b$$

이다.

### 1.3

**풀이** 집합  $A$ 의 모든 원소는 두 제곱수의 합으로 이루어져 있다. 그러므로  $A$  안의 임의의 두 수를  $x, y$ 라 하면, 이 두 수는 어떤 정수  $n, m$ 과  $l, k$ 에 대하여 각각

$$x = n^2 + m^2, \quad y = l^2 + k^2$$

과 같은 형태이다. 이때  $x + y = (n^2 + m^2) + (l^2 + k^2) = n^2 + m^2 + l^2 + k^2$ 이고, 이 수는 네 개의 제곱수들의 합이므로  $x + y \notin A$ 이다. 또한

$x - y = (n^2 + m^2) - (l^2 + k^2) = n^2 + m^2 - l^2 - k^2$ 이므로 역시  $x - y \notin A$ 이다. 그리고

$x \div y = (n^2 + m^2) \div (l^2 + k^2) = \frac{n^2 + m^2}{l^2 + k^2} \notin A$ 이다. 그러나

$$\begin{aligned} x \cdot y &= (n^2 + m^2) \cdot (l^2 + k^2) = n^2l^2 + n^2k^2 + m^2l^2 + m^2k^2 \\ &= (n^2l^2 + 2nmlk + m^2k^2) + (n^2k^2 - 2nmlk + m^2l^2) \\ &= (nl + mk)^2 + (nk - ml)^2 \end{aligned}$$

이고,  $n, m$ 과  $l, k$ 가 정수이므로  $nl + mk$ 과  $nk - ml$ 도 정수이다. 따라서  $x \cdot y$ 는 두 제곱수의 합이므로  $x \cdot y \in A$ 이고, 집합  $A$ 는 덧셈에 관하여 닫혀있다.

### 1.5

**풀이**  $y = \left[ \frac{4x + 15}{x + 3} \right] + \frac{x}{3}$ 라 하면,  $\langle y \rangle = 5$ 이므로  $y$ 보다 크거나 같은 가장 작은 정수가 5

이므로  $4 < y \leq 5$ 이다. 즉,  $4 < \left[ \frac{4x + 15}{x + 3} \right] + \frac{x}{3} \leq 5$ 을 만족하는 정수  $x$ 를 구한다.

$x = 1$ 일 때,  $\left[ 4 + \frac{3}{4} \right] + \frac{1}{3} = 4 + \frac{1}{3}$ 이므로 조건을 만족한다.

$x = 2$ 일 때,  $\left[ 4 + \frac{3}{5} \right] + \frac{2}{3} = 4 + \frac{2}{3}$ 이므로 조건을 만족한다.

$x = 3$ 일 때,  $\left[ 4 + \frac{1}{2} \right] + 1 = 4 + 1 = 5$ 이므로 조건을 만족한다.

$x = 4$ 일 때,  $\left[ 4 + \frac{3}{7} \right] + \frac{4}{3} = 5 + \frac{1}{3}$ 이므로 조건을 만족하지 못한다.

따라서 주어진 조건을 만족하는 양의 정수는 1, 2, 3이며, 이들의 합은 6이다.

1.7

**풀이**  $ab > 0$ 이므로  $a, b$ 는 동일한 부호이고,  $a - b > 0, a + b < 0$ 이므로  $b < a < 0$ 이다.  
그러므로

$$\sqrt{a^2} + |3b| - |a + 3b| = (-a) + (-3b) + (a + 3b) = 0$$

이다.

1.9

**풀이** 
$$\begin{aligned} \sqrt{2} + \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} &= \sqrt{2} + \sqrt{3} - \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{(\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{3})} \\ &= \sqrt{2} + \sqrt{3} - \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2 - 3} \\ &= 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} = a\sqrt{2} + b\sqrt{3} \end{aligned}$$

이므로  $a = b = 2$ 이다.

1.11

**풀이** (a)  $z = k(1 + i) - 3 + i = (k - 3) + (k + 1)i$ 이므로

$$\begin{aligned} z^2 &= ((k - 3) + (k + 1)i)^2 = \{(k - 3)^2 - (k + 1)^2\} + 2(k - 3)(k + 1)i \\ &= (-8k + 8) + 2(k - 3)(k + 1)i \end{aligned}$$

이다. 따라서  $z^2$ 이 실수가 되기 위하여  $(k - 3)(k + 1) = 0$ 이어야 하고, 따라서  $k = 3$  또는  $k = -1$ 이다.

(b)  $z^2$ 이 실수가 되기 위하여  $-8k + 8 = 0$ 이어야 하고, 따라서  $k = 1$ 이다.

1.13

**풀이**  $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$ 이므로  $1 + \frac{1}{i} + \frac{1}{i^2} + \frac{1}{i^3} = 1 + \frac{1}{i} - 1 - \frac{1}{i} = 0$ 이다. 그러므로

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{i} + \frac{1}{i^2} + \frac{1}{i^3}\right) + \left(\frac{1}{i^4} + \frac{1}{i^5} + \frac{1}{i^6} + \frac{1}{i^7}\right) + \dots + \left(\frac{1}{i^{96}} + \frac{1}{i^{97}} + \frac{1}{i^{98}} + \frac{1}{i^{99}}\right) \\ = \left(1 + \frac{1}{i} + \frac{1}{i^2} + \frac{1}{i^3}\right) + \frac{1}{i^4} \left(1 + \frac{1}{i} + \frac{1}{i^2} + \frac{1}{i^3}\right) + \dots + \frac{1}{i^{96}} \left(1 + \frac{1}{i} + \frac{1}{i^2} + \frac{1}{i^3}\right) = 0 \end{aligned}$$

이므로  $\left(1 + \frac{1}{i} + \frac{1}{i^2} + \dots + \frac{1}{i^{99}}\right)^2 = 0$ 이다.

1.15

**풀이**  $\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$ 이므로  $a \leq 0, b \leq 0$ 이고  $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{c}{b}}$ 이므로  $c \geq 0, b < 0$ 이다. 또

한  $|c| < |a + b|$ 이므로  $c + a + b < 0$ 이고 따라서 구하고자 하는 값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\sqrt{c^2 - |a+b|} + \sqrt{(a+b+c)^2} &= |c| - |a+b| + |a+b+c| \\ &= c + a + b - a - b - c = 0\end{aligned}$$

### 1.17

**풀이** 우선  $3B - 2C$ 를 먼저 구한다.

$$\begin{aligned}3B - 2C &= 3(x^2 + 2xy - 2y^2 + 2x + 3) - 2(2x^2 + y^2 - x + 2y) \\ &= (3x^2 + 6xy - 6y^2 + 6x + 9) - (4x^2 + 2y^2 - 2x + 4y) \\ &= -x^2 + 6xy - 8y^2 + 8x - 4y + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A - (3B - 2C) &= (2x^2 + xy - y^2 - x + y) - (-x^2 + 6xy - 8y^2 + 8x - 4y + 9) \\ &= 3x^2 - 5xy + 7y^2 - 9x + 5y - 9\end{aligned}$$

### 1.19

**풀이**  $(a - b + c)(a + b - c) = [a - (b - c)][a + (b - c)] = a^2 - (b - c)^2$

$$= a^2 - (b^2 + c^2 - 2bc) = a^2 - b^2 - c^2 + 2bc$$

### 1.21

**풀이**  $a^2 + 3a + 1 = 0$ 이므로  $a \neq 0$ 이고, 따라서 양변을  $a$ 로 나누면  $a + 3 + \frac{1}{a} = 0$  즉,

$a + \frac{1}{a} = -3$ 이다. 따라서  $a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^3 - 3a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right) = (-3)^3 - 3 \cdot (-3) = -18$ 이다.

### 1.23

**풀이**

$$\begin{aligned}2013^2 - 2014^2 - 2015^2 + 2016^2 &= -(2014^2 - 2013^2) + (2016^2 - 2015^2) \\ &= -(2014 - 2013)(2014 + 2013) + (2016 - 2015)(2016 + 2015) \\ &= -4027 + 4031 = 4\end{aligned}$$

### 1.25

**풀이**  $x(x+1)(x+2)(x+3) + 1 = x(x+3)(x+1)(x+2) + 1 = (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2) + 1$

$$= (x^2 + 3x)^2 + 2(x^2 + 3x) + 1 = (x^2 + 3x + 1)^2$$

이므로  $40 \cdot 41 \cdot 42 \cdot 43 + 1 = (40^2 + 3 \cdot 40 + 1)^2 = 1721^2$ 이고, 따라서 구하고자 하는 값은 다음과 같다.

$$\sqrt{40 \cdot 41 \cdot 42 \cdot 43 + 1} = \sqrt{1721^2} = 1721$$

1.27

**풀이**  $t = x^2 + 3x$ 라 하면,

$$\text{준식} = (t+12)(t-2) + 49 = t^2 + 10t + 25 = (t+5)^2 = (x^2 + 3x + 5)^2$$

1.29

**풀이** 우선  $(a-b)^3 + (b-c)^3$ 을 먼저 인수분해한다.

$$\begin{aligned} (a-b)^3 + (b-c)^3 &= [(a-b) + (b-c)][(a-b)^2 + (b-c)^2 - (a-b)(b-c)] \\ &= (a-c)(a^2 + 3b^2 + c^2 - 3ab - 3bc + ac) \end{aligned}$$

그러면

$$\begin{aligned} (a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3 &= (a-c)(a^2 + 3b^2 + c^2 - 3ab - 3bc + ac) - (a-c)^3 \\ &= (a-c)[(a^2 + 3b^2 + c^2 - 3ab - 3bc + ac) - (a-c)^2] \\ &= (a-c)(3b^2 - 3ab - 3bc + 3ac) \\ &= 3(a-b)(b-c)(c-a) \end{aligned}$$

1.31

**풀이**  $A(x) = x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 11x - 6$ 이라 하면,  $A(-2) = 0$ ,  $A(1) = 0$ ,  $A(3) = 0$ 이므로

$$x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 11x - 6 = (x+2)(x-1)(x-3)(px+q)$$

이다. 그러므로 4차 항과 상수항의 계수를 비교하면,  $p=1$ ,  $q=1$ 이고, 따라서 다음을 얻는다.

$$x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 11x - 6 = (x+2)(x-1)^2(x-3)$$

1.33

**풀이**  $(ax-y+b)(x-cy-d) = ax^2 - (ac+1)xy + cy^2 + (b-ad)x + (d-bc)y - bd$ 이므로

$x^2 - 5xy + 4y^2 + x + 2y - 2 = (ax-y+b)(x-cy-d)$ 으로부터 계수를 비교하면, 다음과 같다.

$$a = 1, ac+1 = -5, c = 4, b-ad = 1, d-bc = 2, bd = 2$$

$a = 1$ ,  $c = 4$ 이므로  $b-d = 1$ ,  $d-4b = 2$ 이고, 따라서  $b = -1$ ,  $d = -2$ 이다. 그러므로  $a+b+c+d = 2$ 이다.

1.35

**풀이**  $2x^2 - 4x - 1 = 0$ 의 두 근이  $\alpha$ ,  $\beta$ 이므로  $\alpha + \beta = 2$ ,  $\alpha\beta = -\frac{1}{2}$ 이다. 그러므로

$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 2^3 - 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 2 = 11 \text{ 이고, 따라서}$$

$$\frac{\alpha}{\beta^2} + \frac{\beta}{\alpha^2} = \frac{\alpha^3 + \beta^3}{(\alpha\beta)^2} = \frac{11}{(-1/2)^2} = 44, \quad \frac{\alpha}{\beta^2} \cdot \frac{\beta}{\alpha^2} = \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{1}{-1/2} = -2$$

이므로 구하고자 하는 이차방정식은  $x^2 - 44x - 2 = 0$ 이다.

### 1.37

**풀이** (a)  $\alpha = 1 - \sqrt{2}$  이라 하면,  $\beta = 1 + \sqrt{2}$  이므로  $\alpha + \beta = -\frac{a}{1} = -a$ ,  $\alpha\beta = \frac{b}{1} = b$ 로부터

$$a = -(\alpha + \beta) = -2, \quad b = \alpha\beta = (1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2}) = -1 \text{ 이다.}$$

(b)  $\alpha = 1 + 2i$  이라 하면,  $\beta = 1 - 2i$  이므로  $\alpha + \beta = -\frac{a}{1} = -a$ ,  $\alpha\beta = \frac{b}{1} = b$ 로부터

$$a = -(\alpha + \beta) = -2, \quad b = \alpha\beta = (1 + 2i)(1 - 2i) = 5 \text{ 이다.}$$

### 1.39

**풀이** 두 근을  $\alpha$ ,  $\beta$  라 하면, 조건으로부터  $\alpha = -\beta$ ,  $\alpha + \beta = a^2 - 3a - 4 = 0$ ,  $\alpha\beta = -(a-2)$  이므로  $a^2 - 3a - 4 = (a-4)(a+1) = 0$  으로부터  $a = 4$  또는  $a = -1$  이다. 한편  $\alpha\beta = -\beta^2 < 0$  이므로  $\alpha\beta = -(a-2) < 0$  이어야 한다. 즉,  $a > 2$  를 만족해야 한다. 그러므로 구하고자 하는 값은  $a = 4$  이다.

### 1.41

**풀이** 두 근이 모두 음수이기 위하여

$$D/4 = a^2 - (2a-3) = (a-1)^2 + 2 \geq 0, \quad \alpha + \beta = -2a < 0, \quad \alpha\beta = 2a-3 > 0$$

이어야 한다. 따라서 세 조건으로부터  $a$  의 범위는 각각 다음과 같다.

$$\text{모든 실수, } a > 0, \quad a > \frac{3}{2}$$

그러므로 세 조건을 모두 만족시키는  $a$  의 범위는  $a > \frac{3}{2}$  이다.

### 1.43

**풀이** 양변을  $1+i$  로 나누면,

$$x^2 - \frac{2(1-i)}{1+i}x - 1 = 0; \quad xx^2 + 2ix - 1 = x^2 + 2ix + i^2 = (x+i)^2 = 0$$

이므로  $x = -i \pm \sqrt{(-i)^2 + 1} = -i$  (중근)이다.

### 1.45

**풀이** 방정식에  $|2x-1|$  가 포함되어 있으므로  $x \geq \frac{1}{2}$  인 경우와  $x < \frac{1}{2}$  인 경우로 구분하여 조건에 맞는 근을 구한다.

(i)  $x \geq \frac{1}{2}$ 인 경우 :  $x^2 + |2x - 1| - 7 = x^2 + 2x - 8 = (x + 4)(x - 2) = 0$  이므로  $x = -4$  또

는  $x = 2$ 이고,  $x \geq \frac{1}{2}$ 이므로 주어진 이차방정식의 근은  $x = 2$ 이다.

(ii)  $x < \frac{1}{2}$ 인 경우 :  $x^2 + |2x - 1| - 7 = x^2 - (2x - 1) - 7 = x^2 - 2x - 6 = 0$ 이므로

$$x = -(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 1 \cdot (-6)} = 1 \pm \sqrt{7}$$

이고,  $x < \frac{1}{2}$ 이므로 주어진 이차방정식의 근은  $x = 1 - \sqrt{7}$ 이다.